



onsior™ GATOS

Comprimidos para Gatos

Robenacoxibe

USO VETERINÁRIO

Fórmula

Cada comprimido contém:

Robenacoxibe 6 mg
Excipiente q.s.p. 96 mg

Indicação

ONSIOR GATOS é indicado para gatos acima de 2,5kg e com mais de 4 meses de idade para:

- Tratamento da dor e inflamação agudas, redução da inflamação e dor moderadas, como as associadas às cirurgias ortopédicas.
- Medicamento auxiliar no controle da dor e inflamação pós-operatória associada às cirurgias de tecidos moles, como a castração.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária

Dosagem, via e modo de administração

Administrar por via oral. Não administrar com alimentos, uma vez que a eficácia de robenacoxibe foi melhor demonstrada sem alimentos ou pelo menos 30 minutos antes ou após a refeição.

ONSIOR GATOS deve ser administrado por via oral em gatos, na dose de 1mg/kg de peso vivo (é aceitável variação de administração de 1mg/kg a 2,4mg/kg).

Administrar uma vez ao dia no mesmo horário de acordo com a tabela a seguir:

Peso corporal	Número de comprimidos
2,5 kg a <6,0 kg	1 comprimido
6,0kg a <12,0 kg	2 comprimidos

Nos casos de desordens músculo esqueléticas agudas não administrar **ONSIOR GATOS** por mais de 6 dias.

Quando indicado como medicamento auxiliar no controle da dor e inflamação pós-operatória associadas às cirurgias ortopédicas e castração em gatos, **ONSIOR GATOS** deve ser administrado 1 (uma) vez ao dia por no máximo 3 dias. A primeira dose deve ser administrada aproximadamente 30 minutos (sem alimento) antes do início da cirurgia, no momento da indução da anestesia geral.

Contraindicações

ONSIOR GATOS é contraindicado para:

- Animais que sofram de úlceras gastrointestinais.
- Uso concomitante com corticosteroides ou outras drogas anti-inflamatórias não esteroidais (AINEs).
- Animais que apresentem hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes.
- Animais prenhes ou lactantes, uma vez que a segurança de uso de robenacoxibe não foi testada nestas condições.

Reações Adversas

Reações adversas relacionadas ao trato digestivo são comumente reportadas, mas na maioria dos casos foram leves e os animais se recuperaram sem a necessidade de tratamento. Vômitos e alterações nas fezes são ocorrências muito comuns, diminuição do apetite e diarreia são comuns, e ocorrência de sangue nas fezes é incomum. Em casos muito raros, letargia pode ser observada.

Condições de Armazenamento

Conservar o produto em embalagem original, em temperatura de 15°C a 30°C, em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

Este medicamento não deve ser utilizado após o prazo de validade indicado no rótulo.

Mantenha este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Precauções

Uso exclusivamente veterinário.

Precauções para o uso em animais

Administrar por via oral.

Não administrar junto com alimentos, uma vez que nos estudos clínicos foi demonstrada melhor eficácia de

robenacoxibe quando administrado sem alimentos, ou pelo menos 30 minutos antes ou após a refeição.

ONSIOR GATOS não foi testado em animais com menos de 2,5kg de peso vivo nem em animais com menos de 4 meses de idade.

Não exceder a dose diária recomendada.

O uso em gatos com funções cardíacas, renais ou hepáticas prejudicadas, ou com sinais de desidratação, baixo volume sanguíneo circulante ou baixa pressão pode envolver riscos adicionais. Se o uso for inevitável, estes animais devem ser cuidadosamente monitorados.

Utilizar **ONSIOR GATOS** sob monitoramento veterinário rigoroso em gatos com risco de úlceras gástricas ou se o animal demonstrou previamente intolerância ao uso de outros anti-inflamatórios não esteroidais. Não deve ser utilizado em humanos.

Precauções a serem tomadas pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais

Lavar as mãos e partes expostas ao medicamento após o uso do produto.

No caso de ingestão acidental, procurar atendimento médico imediatamente levando a embalagem e a bula do produto. Para mulheres grávidas, particularmente no final da gestação, a ingestão acidental ou exposição dérmica prolongada podem aumentar o risco para o feto.

Interações Medicamentosas

Em gatos saudáveis tratados com ou sem furosemdia diurética, a administração concomitante de **ONSIOR GATOS** com o inibidor da ECA benazepril por 7 dias não foi associada a efeitos negativos nas variáveis renais incluindo taxa de filtração glomerular.

Outras informações

Robenacoxibe é um anti-inflamatório não esteroideal que inibe seletivamente a enzima ciclooxigenase 2 (COX-2), a qual é responsável pela dor, inflamação ou febre. A enzima ciclooxigenase 1 (COX-1), que é responsável pelas funções de proteção do trato digestivo e rins, não é inibida pelo Robenacoxibe. Em estudos clínicos realizados em gatos, **ONSIOR GATOS** reduziu a dor e a inflamação associadas às desordens músculo esqueléticas agudas e a necessidade de tratamento suporte quando utilizado como pré medicação nos casos de cirurgias, em combinação com o uso de opioides.

Apresentações:

ONSIOR GATOS é registrado em cartuchos contendo 1, 2, 5 ou 10 blisters com 6 comprimidos cada.

Proprietário:

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, Indiana, EUA.

Fabricante:

Elanco France, 26 Rue de La Chapelle, 68330 Huingue, França.

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:

ELANCO SAÚDE ANIMAL LTDA.
Av. Prof. João Vilalobo Quero, 2.253 - Barueri - SP
CNPJ: 00.820.120/0005-69
www.elanco.com.br

Responsável Técnica: Débora Andrade - CRMV-SP nº 20.963

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura e Pecuária sob o número 11/2019 em 30/05/2019.

PRODUTO IMPORTADO



SAC-E
0800 011 2690

sac@elancoah.com

Onsior, Elanco e o logo da barra diagonal são marcas da Elanco ou suas afiliadas.

© 2024 Elanco or its affiliates

