

Elura™ (Capromorelina Solução Oral)

USO VETERINÁRIO

20 mg/mL

Solução Oral para Gatos

FÓRMULA:

Cada 1 mL contém:

Tartarato de capromorelina . . . 20 mg

Excipientes q.s.p. 1 mL

Indicações de uso

Para o gerenciamento da perda de peso em gatos com doença renal crônica (DRC).

Dosagem e Administração

Administrar ELURA por via oral na dose de 2 mg de capromorelina por kg de peso vivo, equivalente a 0,1 mL/kg de Elura, uma vez ao dia.

Para administrar ELURA:

1. Remover a tampa, inserir a seringa dosadora, virar o frasco de ponta cabeça, puxar a quantidade apropriada da solução;
2. Retornar o frasco para a posição correta, remover a seringa, colocar a tampa;
3. Administrar a solução diretamente na boca do gato;
4. Enxaguar a seringa e o êmbolo com água, deixar a parte para secar.

Se o gato for alimentado com refeições rotineiramente, ofereça comida 30 minutos após a administração da dose.

Se o gato vomitar em até 15 minutos ou receber apenas uma dose parcial, a dose pode ser administrada novamente.

Modo de ação

ELURA é um agonista seletivo do receptor de grelina. O receptor de grelina é encontrado em muitos tecidos em várias espécies e pode ter efeitos no sistema nervoso central, trato gastrointestinal, sistema cardiovascular e homeostase energética. ELURA se liga a receptores no hipotálamo para estimular o apetite e na hipófise para estimular a secreção do hormônio do crescimento (GH). O aumento do GH estimula a liberação do fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) do fígado, que por sua vez pode estimular o ganho de peso. O IGF-1 permanece elevado durante a administração do produto. Em humanos, a elevação de IGF-1 pode atuar como um regulador de feedback negativo do GH, mas isso é desconhecido em gatos. Acredita-se que os efeitos clínicos de ELURA em gatos se devam a uma combinação de aumento da ingestão de alimentos e alterações metabólicas que resultam em ganho de peso.

Advertências

Proibido o uso em humanos. Consulte um médico em caso de ingestão acidental por humanos.

Para uso oral apenas em gatos.

Não administrar a gatos com hipersomatotropismo (acromegalia).

Elura pode aumentar a glicose sérica por várias horas após a administração. O uso em gatos com diabetes mellitus ou histórico não foi avaliado e o uso pode não ser apropriado.

Use com cautela em gatos que possam ter doença cardíaca ou desidratação grave. ELURA causa diminuições transitórias na frequência cardíaca e pressão arterial até 4 horas após a administração da dose. Alguns gatos podem apresentar sinais clínicos de bradicardia ou hipotensão após a administração de ELURA.

Usar com cautela em gatos com disfunção hepática. A capromorelina é metabolizada no fígado em humanos e cães e espera-se um metabolismo semelhante no gato.

O uso seguro de ELURA não foi avaliado em gatos com menos de 9 meses de idade.

O uso seguro de ELURA não foi avaliado em animais gestantes, lactantes ou destinados à reprodução.

Reações Adversas

Estudos de segurança realizados mostraram que gatos com insuficiência renal crônica (DRC) em diferentes estágios, $\geq 5\%$ de perda de peso não intencional e tratados com Elura podem apresentar reações adversas como vômito, hipersalivação, inapetência, mudança de comportamento, letargia, anemia, desidratação, diarreia, hiperglicemia e ataxia.

Informação para os proprietários de gatos

Os proprietários devem ser informados de que ELURA imita a ação de um hormônio natural chamado grelina, que influencia muitos sistemas no corpo. Os proprietários devem monitorar alterações em: sede ou ingestão de água; letargia ou fraqueza; problemas digestivos (vômitos, diarreia, sialorreia, diminuição do apetite); ou comportamentos.

Contraindicações

Elura não deve ser utilizado em gatos que possuam sensibilidade ao ativo Capromorelina.

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Conservar o produto em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar, à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Após aberto, o produto deve ser utilizado em até 90 (noventa) dias.

Apresentação

Solução oral flavorizada em frasco contendo 15 mL, com uma seringa de dosagem.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Proprietário

Elanco US Inc.

2500 Innovation Way, Greenfield, Indiana - EUA

Fabricante

Halo Pharmaceutical Canada Inc.,

17800 Rue Lapointe, Mirabel Quebec, J7J 0W8 - Canada

Representante exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:

Elanco Saúde Animal Ltda.

Rua Edgar Marchiori, 255 – Setor Elanco

Vinhedo - SP

CNPJ: 00.820.120/0004-88

www.elanco.com.br

Responsável Técnica:

Débora Andrade – CRMV/SP nº 20.963

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000626-2.000038 em 26/04/2024.

PRODUTO IMPORTADO

Elura, Elanco e o logo da barra diagonal são marcas da Elanco ou suas afiliadas.

© 2022 Elanco or its affiliates



SAC-E
0800 011 2690

sac@elancoah.com