

Elanco

Baytril®

Injetável 5%
Uso Veterinário
Antimicrobiano



Baytril® Injetável 5% é um agente quimioterápico de ação bactericida pertencente ao grupo das quinolonas. Possui um largo espectro de ação antimicrobiana e distingue-se por uma atividade "in vitro" e "in vivo" particularmente elevada, devido a um efeito bactericida. **Baytril® Injetável 5%** possui uma alta eficácia contra bactérias resistentes a outros antimicrobianos.

Modo de ação: Devido ao seu especial mecanismo de ação, as quinolonas recebem o nome de "Inibidores da Girase" bacteriana. Os "Inibidores da Girase" atuam diretamente sobre a enzima DNA-girase, intervindo, assim, ativamente no ponto central do metabolismo bacteriano. Isto provoca danos irreversíveis ao DNA e morte da bactéria. O pico máximo da enrofloxacina é atingido em até 2 horas e meia e suas principais vias de eliminação são pelas fezes e urina.

Composição: Cada 100 mL contém:

Enrofloxacina 5 g
Veículo q.s.p. 100 mL

Indicações: A enrofloxacina atua contra as seguintes infecções bacterianas dos cães e gatos: dérmicas (piodermites), respiratórias, entéricas, do ouvido, geniturinárias, pós-operatórias e causadas em decorrência de laparotomias e lesões acidentais.

Baytril® Injetável 5%, é indicado para o uso intravenoso ou subcutâneo em cães e gatos para o tratamento de infecções causadas por cepas sensíveis das seguintes bactérias

gram-negativas e gram-positivas: *Bordetella bronchiseptica*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella Typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* e *Streptococcus agalactiae*.

Modo de usar: Baytril® Injetável 5% já vem pronto para o uso. Para utilização, basta aplicar o produto por via intravenosa ou subcutânea, com o auxílio de uma seringa e agulha, sempre utilizando luvas protetoras. A seringa, agulha e luvas não acompanham o produto. Recomenda-se que a aplicação seja feita por um médico veterinário.

Dosagens: A dosagem terapêutica para cães e gatos é de 5,0 mg do princípio ativo por kg de peso, ou seja, 1 mL de **Baytril® Injetável 5%** para cada 10 kg de peso corporal. A aplicação deve ser feita uma vez por dia, durante 5 dias consecutivos, ou a critério do médico veterinário.

Interações medicamentosas: A enrofloxacinina não deve ser utilizada concomitantemente com outras substâncias antimicrobianas antagonistas das quinolonas. A utilização da enrofloxacinina concomitantemente com flunixin pode alterar a farmacocinética de ambas as drogas, por isto deve ser feita com cautela, sob avaliação do médico veterinário.

Contraindicações e reações adversas: Não foram realizados estudos de segurança do produto em animais gestantes e lactantes, portanto não se recomenda a utilização do **Bay-tril® Injetável 5%** em fêmeas que estejam neste período. Em testes clínicos de campo não foram relatados casos de claudicação ou problemas nas juntas de quaisquer raças. De acordo com estudos toxicológicos, a enrofloxacinina é contraindicada em cães de raças pequenas e médias durante a fase de crescimento rápido: período entre 2 e 8 meses de idade para raças pequenas e médias; e até 18 meses para raças grandes. Não é recomendado o uso em gatos com menos de 8 semanas de idade. Gatos podem apresentar danos oculares irreversíveis, como degeneração de retina, em caso de sobredosagem e uso prolongado em doses elevadas, acima das indicadas em bula. Não utilizar em cães com lesões persistentes em cartilagens articulares, pois as lesões podem se agravar durante o tratamento com fluoroquinolonas. Não indicado para animais com histórico de hipersensibilidade a qualquer componente do produto e para animais com histórico de alterações do sistema nervoso central: como epilepsia, pois as fluoroquinolonas podem causar convulsões em animais predispostos. Como qualquer outro medicamento, reações de hipersensibilidade (como angioedema, urticária, choque anafilático, entre outros) podem ocorrer em organismos sensíveis.

Recomendações e precauções: Em caso de sobredosagem, é recomendado aplicar tratamento sintomático. Não existe antídoto específico conhecido para a enrofloxacinina (ou qualquer outra fluoroquinolona). Quando da injeção por via subcutânea, eventualmente podem ocorrer reações cutâneas locais, motivo pelo qual recomenda-se o uso de compressasquentes no ponto da aplicação, logo após a administração do produto. A enrofloxacinina é excretada principalmente pela urina e fezes, portanto recomenda-se o uso com cautela em animais com função renal e/ou hepática comprometida, fazendo-se necessária uma avaliação se a relação risco x benefício, através de exames laboratoriais e análises clínicas por um médico veterinário. Recomenda-se pesar o animal com o objetivo de evitar erros na dosagem. As fluoroquinolonas devem ser reservadas para o tratamento de condições clínicas que não respondem ou possuem eficácia reduzida a outras classes antimicrobianas. Não comer, beber ou fumar durante a manipulação do

produto veterinário. Observar os cuidados normais de assepsia para injeções nos animais. O produto só deve ser utilizado de acordo com as orientações de bula. Sempre que possível, as fluoroquinolonas devem ser utilizadas somente após isolamento e determinação da susceptibilidade da bactéria isolada. O uso do produto em desacordo com as indicações de bula pode aumentar a prevalência de resistência bacteriana a fluoroquinolonas e diminuir a eficácia do tratamento com outras fluoroquinolonas, devido a potencial resistência cruzada. Mantenha o produto na embalagem original. Descartar a embalagem e restos do produto de forma segura, evitando contaminar o meio ambiente. Usar luvas protetoras para administrar o produto. Evite o contato do produto com a pele, olhos e boca. Após a aplicação, remover as luvas e lavar bem as mãos. No caso de contato direto com os olhos e pele, lave-os imediatamente com água corrente. No caso de persistência dos sintomas cutâneos e oculares, ou no caso de ingestão acidental, procure o serviço médico de emergência, levando consigo a embalagem do produto.

Modo de conservação: Conservar o produto em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar, à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

LEVE SEU CÃO E SEU GATO REGULARMENTE AO MÉDICO VETERINÁRIO.

Apresentação: Frasco-ampola contendo 10 mL.

Proprietário: Elanco US Inc.,
2500 Innovation Way, Greenfield, Indiana, EUA.

Fabricante: ELANCO ANIMAL HEALTH KOREA CO., LTD.
14, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do,
15427, Coreia do Sul

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor: ELANCO SAÚDE ANIMAL LTDA.,
Rua Edgar Marchiori, 255. CEP:13288-006
Vinhedo – SP

CNPJ: 00.820.120/0004-88

www.elanco.com.br

Responsável Técnica: Débora Andrade - CRMV/SP nº 20.963
Licenciado no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento sob
nº SP 000626-2.000003 em 13/11/1987.

PRODUTO IMPORTADO

Baytril, Elanco e o logo da barra diagonal são marcas da Elanco ou suas afiliadas.

© 2021 Elanco or its affiliates

