

FRONTLINE®

SPRAY (Fipronil)

USO VETERINÁRIO

Mata Pulgas e Carrapatos em Cães e Gatos Aplicação Tópica

COMPOSIÇÃO

Fipronil: 0,25 g; Veículo q.s.p. 100.00 mL

INDICAÇÕES

Cães e Gatos (adultos e filhotes): Tratamento e controle de infestações por pulgas e carrapatos em cães e gatos adultos e filhotes de cães e gatos a partir de 2 dias de vida.

Para o tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulga (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais nos animais alérgicos (DAPP) e em outros cães e gatos que com eles convivem.

FRONTLINE® SPRAY mata as pulgas rapidamente após o contato.

FRONTLINE® SPRAY controla rapidamente as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus*, *Dermacentor*, *Amblyomma* (vetor da Febre Maculosa), *Haemaphysalis* e *Ixodes*, o principal vetor da Doença de Lyme humana e canina.

Um único tratamento de **FRONTLINE® SPRAY** pode proteger cães (adultos e filhotes) contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por 5 semanas.

Um único tratamento de **FRONTLINE® SPRAY** pode proteger gatos (adultos e filhotes) contra pulgas por 6 semanas e contra carrapatos por 4 semanas.

MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pêlo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual.

DOSES E MODO DE USAR

Dose

Frasco de 100 mL: Aplicar 6 a 12 jatos de spray para cada quilo de peso do animal.

Frascos de 250 mL: Aplicar 2 a 4 jatos de spray para cada quilo de peso do animal.

A dosagem equivale de 3 a 6 mL de produto por quilo de peso (7,5 mg a 15 mg de fipronil por kg). Desta forma, recomenda-se o frasco de 100 mL para animais até 15 Kg de peso e o frasco de 250 mL para animais até 40 Kg de peso. Para animais acima de 40 Kg de peso, somar o volume necessário para obter a dose certa, de acordo com o peso do animal. Isto garante a aplicação da dose mínima recomendada de 7,5 mg de fipronil por Kg de peso para cães e gatos.

Modo de Usar

Produto somente de aplicação tópica (uso externo).

1
Na embalagem de 250 mL, o jato de pulverização pode ser regulado, girando-se a cúpula azul.

2
Para que o tratamento seja eficaz, deve-se umedecer completamente toda a pele e pêlos do animal com **FRONTLINE® SPRAY**.

3
Para uma melhor distribuição do produto, pulverizar no sentido contrário ao do crescimento dos pêlos.

4
Durante a aplicação, massagear os pêlos para que o produto atinja a pele. As luvas facilitam essa tarefa.

5
FRONTLINE® SPRAY deve ser aplicado em todo o corpo do animal. Não esquecer da barriga, patas e cauda.

6
Para aplicar na região da cabeça, borrifar o produto nas luvas e esfregar suavemente na face do animal, evitando a região dos olhos. Deixar o produto secar naturalmente. **NÃO USAR TOALHAS PARA SECAR O ANIMAL.**


FRONTLINE® SPRAY se distribui sobre a pele e pêlos, mantendo sua ação contra pulgas e carrapatos por várias semanas após o tratamento.

PRECAUÇÕES


Pulverizar os animais em local bem ventilado. Evitar pulverizar nos olhos dos animais. Usar luvas, especialmente durante o tratamento de grupos de animais. Lavar as mãos após o uso. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRONTLINE® SPRAY não é repelente, matando rapidamente pulgas e carrapatos oriundos do meio-ambiente que entrem em contato com os animais. Pode ocorrer a fixação de carrapatos antes de sua morte. Por esta razão, a possibilidade da transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente



excluída. A maioria dos carrapatos mortos cairá do corpo do animal, enquanto que os que permanecerem poderão ser retirados facilmente.



As formas imaturas de pulgas do ambiente correspondem a 95% da infestação. As formas adultas que estão nos animais correspondem a apenas 5% do problema.

As formas imaturas das pulgas já presentes no meio ambiente no momento da aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar seus ciclos, havendo reinfestação dos animais após o tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental mantenha seu animal protegido com **FRONTLINE® SPRAY** e caso necessário faça uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas com produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

Mesmo aplicado logo após o banho, **FRONTLINE® SPRAY** garante proteção contra pulgas em cães por pelo menos 45 dias.

Recomenda-se o uso contínuo do produto em todos os cães e gatos que tiverem contato com o animal para que se possa obter sucesso no tratamento.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não utilizar em coelhos, pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança de **FRONTLINE® SPRAY** foi demonstrada por experimento após o uso do produto com intervalos de 28 dias durante 6 meses. Utilizou-se uma dose 5 vezes superior a dose recomendada para cães (de 10 semanas de idade) e gatos (de 12 semanas de idade).

FRONTLINE® SPRAY é bem tolerado por filhotes de cães e gatos após o tratamento das fêmeas lactantes. **FRONTLINE® SPRAY** pode ser aplicado em filhotes de cães e gatos já a partir do 2º dia de vida.

EFEITOS ADVERSOS

Embora **FRONTLINE® SPRAY** apresente um elevado nível de segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado.

Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos transitórios de reação cutânea eritematosa, prurido ou o desenvolvimento de alopecia.

Não utilizar o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar. Tratar os animais de acordo com a posologia correta baseada no peso corporal do animal. Em caso de suspeita de reações adversas, procurar imediatamente o Médico Veterinário. Caso necessário entrar em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor. Evitar o contato do produto com os olhos dos animais.

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS

A formulação contém um agente de revestimento, tornando o pelo lustroso.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos. Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lavar cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; evitar contato do produto com as mãos.

Mantem fora do alcance das crianças e animais domésticos.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Produto inflamável. Conservar longe do calor, sob temperatura de até 30°C.

Prazo de validade após a primeira abertura do frasco: 6 meses.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 100 mL e 250 mL.

Uso sob orientação do médico-veterinário.

Produto importado

Licenciado no MAPA desde 29/11/1994.
Registrado sob o nº SP 000023-0.000004

Proprietário:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Alemanha.

Fabricante:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, França.

Representante Exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda
Av. Doutor Roberto Moreira, 5005
Recanto dos Pássaros – Paulínia/SP
CEP: 13148-914
CNPJ 57.600.249/0001-55
Indústria Brasileira.

Embalado por:

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
CNPJ 64.687.015/0001-52

Resp. Técnica: Simone B. Zampieri CRMV-SP nº 19.996

SAC: 0800 888 7387