



MODELO DE BULA

VERAFLOX® SUSPENSÃO

Uso Oral

Suspensão 25 mg/mL para gatos

USO VETERINÁRIO

Composição:

Cada mL contém:

Pradofloxacino 25 mg

Veículo q.s.p. 1 mL

Indicações:

Veraflox® Suspensão é um medicamento à base de Pradofloxacino, uma nova geração de quimioterápico bactericida. Pertence ao grupo das quinolonas e possui rápida absorção, metabolização e distribuição no organismo. Em contraste com fluoroquinolonas de gerações anteriores, **Veraflox® Suspensão** possui eficácia superior contra agentes patogênicos bacterianos Gram positivos e anaeróbios.

Veraflox® Suspensão possui moderno componente palatável que facilita a aceitação do medicamento pelos animais.

Veraflox® Suspensão é indicado para gatos no tratamento de infecções causadas por cepas sensíveis ao Pradofloxacino das seguintes bactérias: *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumonia*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus canis*.

É especialmente indicado nas seguintes patologias:

- Infecções do trato urinário causadas pelas cepas sensíveis de *Escherichia coli*, *Staphylococcus intermedius*, *Proteus mirabilis* e *Streptococcus canis*.
- Infecções do trato respiratório superior causadas por cepas sensíveis de *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus canis*.
- Infecções de feridas e abscessos causadas por cepas sensíveis de *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Streptococcus canis* e *Pasteurella multocida*

Modo de ação:

O principal mecanismo de ação envolve interação do pradofloxacino com enzimas essenciais na replicação, transcrição e recombinação de DNA bacteriano. Os principais alvos do pradofloxacino nas bactérias são as enzimas DNA Girase e Topoisomerase IV. Ligações reversíveis entre o pradofloxacino e estas enzimas nas bactérias alvo, resultam na inibição dessas enzimas e morte da célula bacteriana.

Modo de usar e via de administração:

Veraflox® Suspensão deve ser administrado por via oral em gatos.

Dosagens:

A dose recomendada é de 5mg/kg de peso vivo de pradofloxacino a cada 24 horas. O tempo de tratamento pode variar de acordo com o tipo de infecção, gravidade do quadro ou a critério do Médico Veterinário. Como referência consulte a tabela abaixo:

Indicações	Duração do tratamento
Infecções do trato respiratório superior	5 dias
Infecções de feridas e abscessos	7 dias
Infecções agudas do trato urinário	18 dias

Para assegurar uma dosagem correta, deve-se determinar o peso corporal com a maior exatidão possível para evitar a subdosagem.

A mesma seringa não deve ser utilizada em animais diferentes, para evitar contaminações cruzadas.

Recomendações e Precauções:

Agite bem antes de usar.

Recomenda-se quando possível, a realização prévia de testes de susceptibilidade antimicrobiana.

O uso de **Veraflox® Suspensão** em desacordo com as indicações de bula pode aumentar a prevalência de resistência bacteriana a fluoroquinolonas e diminuir a eficácia do tratamento com outras fluoroquinolonas, devido ao risco potencial de resistência cruzada.

O pradofloxacino pode aumentar a sensibilidade da pele à luz solar. Durante o tratamento os animais não devem ser expostos à luz solar excessiva.

A excreção via renal é uma importante via de eliminação do pradofloxacino. Assim como para outras fluoroquinolonas, a taxa de excreção renal do pradofloxacino pode decair com a função renal comprometida e por isso recomenda-se o uso com cautela nesses animais, avaliando-se a relação risco x benefício através de exames laboratoriais.

Pessoas com hipersensibilidade conhecida as quinolonas devem evitar qualquer contato com o produto veterinário. Como qualquer outro medicamento, reações anafiláticas podem ocorrer em animais sensíveis ao ingrediente ativo. Evitar o contato com a pele e olhos e lavar bem as mãos após o uso.

Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água.

Não comer, beber ou fumar durante a manipulação do produto veterinário.

Em caso de ingestão acidental, procure o serviço médico de emergência levando consigo a embalagem do produto. O produto veterinário e sua embalagem devem ser descartados em conformidade com as normas brasileiras vigentes. Não contamine coleções de água de qualquer natureza. Mantenha o produto na embalagem original.

Não use a embalagem vazia.

Mantenha o produto afastado do fogo e do calor excessivo.

Interações medicamentosas:

Veraflox® Suspensão não deve ser administrado concomitantemente com antiácidos e sucralfatos que contém hidróxido de magnésio ou de alumínio; com multivitamínicos que contenham ferro ou zinco ou produtos lácteos, pois a absorção de **Veraflox® Suspensão** pode ser reduzida.

Deve ser evitada a administração de **Veraflox® Suspensão** juntamente com anti-inflamatórios não esteroidais em animais com histórico de convulsões, devido à potencial interação farmacodinâmica das fluoroquinolonas no Sistema Nervoso Central.

Também deve ser evitada a administração de **Veraflox® Suspensão** juntamente com Teofilina, pois pode ocorrer o aumento do nível plasmático desta, assim como o uso concomitante com Digoxina, que pode ter sua biodisponibilidade alterada.

Reações Adversas

Distúrbios gastrointestinais leves e transitórios, incluindo vômitos, podem ocorrer raramente. Neste caso o uso do medicamento deverá ser interrompido e na persistência dos sinais o médico veterinário deverá ser consultado para o tratamento sintomático.

Em estudos realizados com **Veraflox® Suspensão** em uma dosagem 5 vezes maior que a recomendada em bula, os gatos tratados não apresentaram reações adversas.

Entretanto, em caso de sobredosagem com surgimento de sinais clínicos, é recomendado aplicar tratamento sintomático.

Contraindicações:

Não utilizar em gatos com hipersensibilidade conhecida a fluoroquinolonas.

Devido à falta de dados disponíveis o pradofloxacino não deve ser utilizado em filhotes de gatos com idade inferior a 6 semanas.

O pradofloxacino não tem efeito no desenvolvimento da cartilagem de gatos com idade igual ou superior a 6 semanas. Não utilizar em gatos com lesões persistentes em cartilagens articulares, pois as lesões podem se agravar durante o tratamento com fluoroquinolonas.

Não utilizar em gatos com desordens no Sistema Nervoso Central, como epilepsia, pois as fluoroquinolonas podem causar convulsões em animais predispostos.

Não utilizar em gatos durante a gestação e lactação. O pradofloxacino não possui efeitos deletérios na fertilidade dos gatos.

Conservação:

Armazene na embalagem original e mantenha o frasco fechado. Conservar o produto em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar, à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

Após aberto o produto deve ser utilizado em até 3 meses, após este período deve ser descartado.

Apresentações:

Cartucho com 1 frasco de 15 mL com adaptador, acompanhados de seringa graduada.

Cartucho com 1 frasco de 30 mL com adaptador.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Proprietário:

Elanco US Inc.,
2500 Innovation Way, Greenfield, EUA

Fabricante:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel,
Alemanha

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Elanco Saúde Animal Ltda.

Rua Edgar Marchiori, 255

CNPJ: 00.820.120/0004-88

www.elanco.com.br

Responsável Técnica:

Débora Andrade - CRMV/SP nº 20.963

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº

SP 000626-2.000005 em 26/02/2019.

PRODUTO IMPORTADO

Veraflox, Elanco e o logo da barra diagonal são marcas da Elanco ou suas afiliadas.



SAC-E
0800-0112690

sac@elancoah.com

