



## Vacina de Leucemia Felina, Vetor Canarypox vivo

### USO VETERINÁRIO

**Contém:**  
25 frascos de 1 dose de vacina liofilizada  
25 frascos de 0,5 mL de diluente

**Condições de conservação:** Conservar entre 2°C a 8°C. Não congelar.

Usar exclusivamente em Gatos.

**PRODUTO IMPORTADO**

**Proprietário:** Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. - St. Joseph, Missouri 64506, EUA. EUA Vet. Lic. No. 124.

**Fabricante:** Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. - Athens, Georgia 30601, EUA. EUA Vet. Lic. No. 124.

**Representante Exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:** Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda

Av. Doutor Roberto Moreira, 5005 - Recanto dos Pássaros - Paulínia/SP - CEP 13148-914

CNPJ 57.600.249/0001-55

**Responsável Técnica:** Simone Brainer Zampieri - CRMV-SP nº 19.996

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 10.379/2021 em 04/03/2021.

SAC: 0800 888 7387

#### Informações Técnicas:

Purevax® Recombinante FeLV contém uma suspensão liofilizada não adjuvada do vetor recombinante da Leucemia Felina. O vetor canarypox foi modificado utilizando a tecnologia recombinante para produzir a expressão desejada, capaz de estimular a resposta imune protetora contra leucemia felina. A segurança e a imunogenicidade da vacina foram demonstradas através de vacinação e testes de desafios em gatos susceptíveis.

**Indicação:** Purevax® Recombinante FeLV é recomendada para a vacinação de gatos saudáveis a partir de 8 semanas de idade ou mais, como auxiliar na prevenção da doença causada pelo vírus da leucemia felina.

**Posologia, administração e modo de usar:** Asepticamente hidratar a fração liofilizada, com 0,5 mL do diluente que acompanha e agitar. Aplique 0,5 mL (1 dose) por via subcutânea. Em caso de primovacinação, os gatos devem receber uma segunda dose de 0,5 mL após três semanas.

Recomenda-se reforço anual, com uma dose única de 0,5mL.

É recomendado o teste de diagnóstico para FeLV antes da vacinação.

**Contraindicações e precauções:** Não utilizar em gatas prenhes, já que a segurança de Purevax® Recombinante FeLV não pode ser estabelecida em animais desta categoria. Não utilizar seringas e agulhas esterilizadas com agentes químicos, pois podem afetar as características antigênicas da vacina. A vacinação de animais enfermos, subnutridos, com alta carga parasitária ou sob condições de estresse, poderá comprometer o estabelecimento de uma imunidade sólida. Respeitar as condições habituais de assepsia. O processo de vacinação deverá ser precedido de um minucioso exame clínico, realizado por um médico-veterinário. Usar todo o conteúdo imediatamente após a reconstituição. Contém Gentamicina como conservante.

**Reações adversas:** Em casos raros, a administração de vacinas pode causar letargia, febre e reações inflamatórias ou de hipersensibilidade. O tratamento, sob orientação do médico-veterinário, pode incluir antihistamínicos, anti-inflamatórios e epinefrina.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

Proibido a venda fracionada.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.