

RABISIN[®]-i



Vacina inativada contra a raiva

USO VETERINÁRIO

Composição

Produzida com vírus fixo da raiva (1 UI), cultivado em cultura de células, inativada pela betapropiolactona e adicionada de hidróxido de alumínio.

Indicação

Vacina preventiva contra a raiva dos caninos e felinos.

Modo de usar e via de administração

Primovacinação ou reforços anuais: 1 mL por via subcutânea ou intramuscular, conforme indicação, independente do porte do animal.

Espécies	Primovacinação	Reforços
Cães	1 dose a partir de 12 semanas de idade	1 ano após primovacinação Demais reforços: em intervalos de até 3 anos*.
Gatos	1 dose a partir de 4 meses de idade	1 ano após primovacinação Demais reforços: em intervalos de até 3 anos*.

*No Brasil, em alguns estados e/ou municípios, pode haver a necessidade de reforços vacinais anuais contra a raiva requerido pela legislação. Neste caso, é importante salientar que a legislação local é soberana em relação à recomendação desta bula.

Precauções

- Vacinar somente animais em perfeito estado de saúde e corretamente vermifugados no mínimo 10 dias antes da vacinação.
- Respeitar as condições habituais de assepsia.
- Utilizar material estéril para a injeção e sem resíduos de antissépticos ou desinfetantes.
- Recomenda-se não submeter os animais a esforços físicos importantes durante o período de instalação da imunidade.
- Não utilizar em animais prenhes, já que a segurança da vacina Rabisin[®]-i não pôde ser estabelecida em animais desta categoria.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Efeitos secundários

- Como qualquer produto biológico, a vacinação poderá causar excepcionalmente uma reação de hipersensibilidade, que requer tratamento sintomático adequado, segundo prescrição do Médico Veterinário, podendo incluir anti-histamínicos, antiinflamatórios e/ou epinefrina.
- Algumas vezes, a presença do hidróxido de alumínio poderá causar o aparecimento de um pequeno nódulo transitório no ponto da injeção.

Conservar o produto sob refrigeração em temperatura entre 2°C e 8°C. Não congelar. Utilizar a vacina imediatamente após a abertura do frasco.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob n° 6081/1997 em 05/08/1997.

Venda sob prescrição e administração pelo Médico Veterinário.

Apresentações

- Frasco-ampola de vidro contendo 1 mL, acondicionado em caixa com 10 unidades.
- Frasco-ampola de vidro contendo 10 mL, acondicionado em caixa com 10 unidades.
- Frasco-ampola de vidro contendo 20 mL.



927999

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55

Resp. técnica:
Simone B. Zampieri
CRMV-SP N° 19.996

Proprietário:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Alemanha

Fabricante:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Rue de l'Aviation, 69800 St. Priest, França

Número da partida e data da fabricação: vide rótulo do frasco.

PRODUTO IMPORTADO

SAC: 0800 8887387