



superiores a 1 ano para os agentes etiológicos da Leucemia Viral Felina e *Chlamydia felis*.



**Vacina múltipla sem adjuvante contra a rinotraqueíte viral felina, calicivirose, clamidiose, panleucopenia e leucemia felina.**

Uso Veterinário  
Fração liofilizada e diluente.

**Informações Técnicas:**

**PUREVAX® RCPCH FELV** é uma vacina múltipla sem adjuvante contra a rinotraqueíte viral felina (herpesvírus felino vivo modificado, cepa F2), calicivirose (combinação de dois vírus purificados inativados, cepas FCV431 e FCVG1), clamidiose (bactéria viva modificada, cepa 905) e panleucopenia (vírus vivo modificado, cepa PLI IV) e leucemia felina (canarypox-FeLV recombinante, cepa vCP97). A inocuidade e a imunogenicidade do produto foram demonstradas através de testes de vacinação e desafio em gatos susceptíveis.

**Composição:**

Fração liofilizada:

- Herpesvírus atenuado da rinotraqueíte felina (cepa FHV F2;  $\geq 10^{4,9}$  DICC<sub>50</sub>)
- Antígenos inativados da calicivirose felina (cepas FCV 431 e FCV G1;  $\geq 2,0$  ELISA U)
- Vírus atenuado da panleucopenia infecciosa felina (cepa PLI IV;  $\geq 10^{3,5}$  DICC<sub>50</sub>)
- *Chlamydia felis* atenuada (cepa 905;  $\geq 10^{3,0}$  EID<sub>50</sub>)

Fração Diluente:

- Canarypox-FeLV recombinante (vCP97;  $\geq 10^{7,2}$  DICC<sub>50</sub>).

**Indicações:**

**PUREVAX® RCPCH FELV** é recomendada para a vacinação de gatos saudáveis, a partir de 8 semanas de idade, contra doenças causadas pelos vírus da leucemia, rinotraqueíte, calicivirose e da panleucopenia felina, e pela bactéria *Chlamydia felis*.

**Posologia, administração e modo de usar:**

Reconstituir a vacina liofilizada com o diluente líquido que a acompanha. A **PUREVAX® RCPCH FELV** deve ser utilizada pela via de administração subcutânea (SC). A dose de 0,5 mL deve ser aplicada de maneira asséptica e integralmente, qualquer que seja o tamanho, peso, raça ou sexo do animal.

**Esquema de vacinação:**

Primovacinação:

Devem ser realizadas duas doses da vacina, com 3 a 4 semanas de intervalo entre elas (filhotes e adultos).

Filhotes de gatos com menos de 12 semanas de idade devem ser vacinados a cada 3 a 4 semanas, até atingir no mínimo 12 semanas de idade.

Revacinação:

- a revacinação deve ser realizada anualmente após o curso de primovacinação.

O início esperado da imunidade é de duas semanas após a vacinação primária, sendo mantida a capacidade de reduzir os sinais clínicos da rinotraqueíte e calicivirose e na prevenção dos sinais clínicos e mortalidade da panleucopenia, por até 3 anos após a revacinação anual. Não foram conduzidos estudos de duração de imunidade por período

**Contraindicações e Precauções:**

Respeitar as condições habituais de assepsia.

Não utilizar seringas e agulhas esterilizadas com agentes químicos, pois podem afetar as características antigênicas da vacina.

Não utilizar em gatas prenhes ou lactantes, já que a segurança da **PUREVAX® RCPCH FELV** não pode ser estabelecida em animais desta categoria.

A vacinação de animais enfermos, subnutridos, com alta carga parasitária ou sob condições de estresse, poderá comprometer o estabelecimento de uma imunidade sólida.

O processo de vacinação deverá ser precedido de um minucioso exame clínico, realizado por um médico-veterinário.

Recomenda-se a realização prévia de um teste de pesquisa de antígenos do vírus FeLV, pois a vacinação de gatos positivos ao FeLV não é recomendada.

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário, exceto o diluente fornecido pelo fabricante.

Para uso exclusivo em gatos.

Usar todo o conteúdo imediatamente após a reconstituição.

Contém Gentamicina como conservante.

**Reações Adversas:**

Eventualmente, a administração de vacinas poderá causar reações sistêmicas como apatia e anorexia transitórias e hipertermia, ou reações locais, tais como leve dor à palpação, prurido ou edema.

Raramente podem ocorrer reações de hipersensibilidade. Nestes casos, recomenda-se intervir com o tratamento de suporte adequado. À critério do médico-veterinário, poderão ser utilizados anti-histamínicos, anti-inflamatórios e/ou epinefrina.

**Apresentação:**

Estojo contendo 10 doses (10 frascos de vacina liofilizada e 10 frascos de diluente) ou 50 doses (50 frascos de vacina liofilizada e 50 frascos de diluente).

**Observações:**

Utilizar somente o diluente específico fornecido pelo fabricante desta vacina, visto que todas as provas de controle da qualidade foram realizadas com o diluente próprio.

O sucesso da vacinação depende da utilização adequada do produto e da resposta imunológica de cada indivíduo. Siga corretamente o modo de usar.

**Condições de conservação:**

Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C. Não congelar.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos e ao abrigo da luz. Venda sob prescrição e administração pelo médico-veterinário.

**Proprietário:**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - 55216 Ingelheim/Rhein - Alemanha.

**Fabricante:**

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS - Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest - França

**Representante Exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:**

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda  
Av. Doutor Roberto Moreira, 5005 - Recanto dos Pássaros - Paulínia/SP  
CNPJ 57.600.249/0001-55  
CEP: 13148-914

Licenciado no MAPA sob nº 10.601/2024 em 30/10/2024.

Resp. Técnica: Simone Brainer Zampieri CRMV-SP nº 19.996

**PRODUTO IMPORTADO**

SAC: 0800 888 7387.